



AJI, Connectivites
(Lupus, DMJ, Sclérodermie, ...),
Uvérite inflammatoire, MAI
(PFAPA, FMF, MKD...),
Sarcoïdose, Vascularite (Takayasu, PAN...),
Kawasaki, OCMR, Behçet, etc.

Autres Urgences



Varicelle
sous
immuno-
modulateur

maladie
déclarée

- Mettre sous zovirax per os
- Arrêt de la biothérapie
- Pas d'arrêt systématique du méthotrexate ou de l'imurel (cf médecin référent)
- Pas d'AINS même si douleur articulaire ou poussée déclenchée par la varicelle

maladie
non
déclarée

- Penser à vacciner avant mise sous *TTT
- AMM dès l'âge de 9 mois / 12 mois
- 2 doses espacées de 4 à 8 sem. (Varivax®) ou de 6 à 10 sem. (Varilrix®)
- 1^{ère} dose au moins 15jrs < début de biothérapie ou *DMARDS
- Peut être faite sous corticoïdes : voir Infovac /contre-indications vaccinales



Urticaire
sous biothérapie

- Localisation, aspect, durée et extension des lésions
- Réactions connues au site d'injection sans risque d'allergie secondaire (anti-IL1)
- Consulter fiche du *CRL< avant d'évoquer une allergie médicamenteuse et d'arrêter le médicament



**Gastro
entérite**

Sous Colchicine

- Intoxication ? (revoir les doses)
- Si diarrhée importante : arrêt de la Colchicine transitoirement

! Bonne hydratation !

Sous AINS

Arrêt des AINS



Oeil rouge

- Si associé à douleur : éliminer une uvéite avant de conclure à une conjonctivite
- Adresser à un ophtalmologue dans les 24h

Réseau Rhumatismes Inflammatoires Pédiatriques

en Île-de-France



Infirmières du RESRIP : 06.47.68.58.80 / 06.08.99.45.57

contact@resrip.fr

www.resrip.fr